

549,063

PCT/PTD 2004/057946

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2004 (15.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/057946 A2(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A01H 1/00**(74) Anwalt: FITZNER, Uwe; Lintorfer Strasse 10, 40878
Ratingen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/014774

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. Dezember 2003 (23.12.2003)

(25) Elnreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 60 707.9 23. Dezember 2002 (23.12.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT [DE/DE];
Hofgartenstr. 8, 80539 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEIGENBERGER,
Peter [DE/DE]; Quantzstr. 12, 14129 Berlin (DE).
LANGER, Anke [DE/DE]; Sellostr. 27, 14471 Potsdam
(DE). VIGEOLAS, Helene [FR/DE]; Am alten Mörtel-
werk 14, 14469 Potsdam (DE). STITT NIGEL, Marc
[DE/DE]; Grosse Weinmeisterstr. 22a, 14469 Potsdam
(DE). THOMAS VAN DONGEN, Joost [NL/DE];
Leipziger Str. 52, 14473 Potsdam (DE). UDVARDI,
Michael [DE/DE]; Golmer Fichten 32, 14476 Golm (DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL,
PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des BerichtsZur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR ALTERING THE CONTENT OF RESERVE SUBSTANCES IN PLANTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERÄNDERUNG DES GEHALTS VON SPEICHERSTOFFEN IN PFLANZEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for altering the content of reserve substances in plants during which leghemoglobin and/or hemoglobin expressing transformed plants are used. The invention also relates to corresponding plants and to the use thereof.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen, wo-
bei Leghemoglobin und/oder Hemoglobin exprimierende transformierte Pflanzen eingesetzt werden, entsprechende Pflanzen sowie
deren Verwendung.

WO 2004/057946 A2

**Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen
in Pflanzen**

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen durch Einsatz von Leghemoglobin und/oder Hemoglobin exprimierender transformierter Pflanzen, entsprechende Pflanzen sowie deren Verwendung.

Speicherstoffe in Pflanzen dienen als Reservestoffe und werden von pflanzlichen Geweben gebildet und intrazellulär abgelagert. Als Speicherstoffe dienen z. B. Polysaccharide (Kohlenhydrate wie Lichenin, Stärke, Glykogen, Polyfructosane), Proteine, Fette, auch Polyphosphate und Polyhydroxyalkanoate. Die Speicherstoffe können bei Bedarf wieder in den Stoff- und Energiwechsel eingeschleust werden, beispielsweise bei Nahrungsmangel, der Keimung von Samen, dem Wachstum und sonstigen energieverbrauchenden Vorgängen.

Speicherstoffe sind wertvolle Rohstoffe für die Ernährung (Getreide, Nüsse, Früchte, Obst, Gewürze etc.) und bilden die Basis vieler menschlicher Nahrungsmittel und können auch als Lieferanten für technische Fette und Öle dienen. Andere Speicherstoffe werden wegen ihrer pharmakologisch wirksamen Inhaltsstoffe arzneilich genutzt. (Quelle: CD Römpp Chemie Lexikon – Version 1.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1995).

Auch werden in zunehmendem Maße die Speicherstoffe als nachwachsende und ökologisch verträgliche Rohstoffe für die Industrie angewendet, wie dies z. B. durch die Verwendung von Stärke zur Herstellung von Verpackungsmaterialien oder z. B. von Pflanzenölen als Kraftstoffe, wie Biodiesel oder Schmierstoffe möglich ist.

Die sogenannten sekundären Stoffwechselprodukte (sek. Metaboliten, vgl. a. Stoffwechsel) von Pflanzen (z. B. Farbstoffe, Gifte, etherische Öle, Alkaloide, Fruchtsäuren) werden im allg. nicht zu den Speicherstoffen gezählt (Quelle: Römpp Lexikon Chemie – Version 2.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme
5 Verlag 1999 "Reservestoffe").

In Pflanzen werden die Speicherstoffe in Samen oder Speicherorganen von Kohlenhydrat-Vorstufen gebildet. Dabei ist Saccharose die Primärquelle von Kohlenstoff und Energie, welche von den Blättern in die sich entwickelnden
10 Samen bzw. in Speicherorgane transportiert wird. Die Saccharose in den Blättern wird dabei durch die aus der Photosynthese gewonnene Stärke gebildet. Die Saccharose, die in die sich entwickelnden Samen transportiert wird, dient neben der Synthese von Fettsäuren für die Speicherlipide auch zur Synthese von Speicherproteinen und Speicherstärke.

15

Insgesamt enthalten z. B. Samen drei verschiedene Formen an Speicherstoffen: Speicherlipide, Speicherproteine und Stärke. Je nach Pflanzen variieren dabei die Verhältnisse der drei Speicherstoffe zueinander. So enthalten Rapsorten z. B. etwa 48 % Speicherlipide, 19 % Stärke und 21
20 % Speicherproteine, während Sojabohne 22 % Lipide, 12 % Stärke und 37 % Proteine enthält (Biochemistry & Molecular Biology of the Plant ed. Buchanan, Gruissem, Jones 2000, American Society of Plant Physiologists) bezogen auf ihre Trockenmasse.

25 Die aus den pflanzlichen Ölen (Lipide) erhältlichen Fettsäuren sind von besonderem Interesse. Sie kommen beispielsweise als Grundstoffe für Weichmacher, Schmierstoffe, Tenside, Kosmetika usw. zum Einsatz oder werden in der Lebens- und Futtermittelindustrie als wertvolle Grundstoffe eingesetzt. So ist beispielsweise die Bereitstellung von Rapsölen mit

Fettsäuren mittlerer Kettenlänge von besonderem Interesse, da diese besonders für die Tensidherstellung begehrt sind.

5 Durch die gezielte Modulation pflanzlicher Stoffwechselwege mittels gentechnischer Verfahren kann der pflanzliche Metabolismus in einer Weise vorteilhaft verändert werden, die durch klassische Züchtungsmethoden nur über langwierige Schritte bzw. überhaupt nicht zu erreichen wären. So werden z. B. ungewöhnliche Fettsäuren, beispielsweise bestimmte mehrfach ungesättigte Fettsäuren, nur in bestimmten Pflanzen bzw. überhaupt nicht in
10 Pflanzen synthetisiert und können deshalb nur durch Expression des entsprechenden Enzyms in transgenen Pflanzen gezielt hergestellt werden (z. B. Millar et al. (2000) Trends Plant Sci 5:95-101).

15 Stärke als Speicherstoff kann nicht nur in Samen eingelagert werden, sondern auch in anderen Speicherorganen. Wichtige Speicherorgane für Stärke sind dabei Hypokotyl und Wurzeln. Durch Vermehrung und Vergrößerung der Zellen des Rindenparenchyms entstehen Wurzelknollen, wie z. B. Kartoffelknollen oder bei Verdickung des Wurzelhalses Wurzelrüben, wie z. B. Zuckerrübe oder Yams.

20

So ist Stärke z. B. der Hauptbestandteil der Kartoffel-Trockensubstanz. Neben der Verwendung als Lebensmittel dient die Kartoffel daher auch als Futtermittel und als Rohstoff zur Gewinnung von Stärke und Alkohol. Weltweit wurden 1988 269,7 Mio. t Kartoffeln geerntet. (Quelle: CD Römpp Chemie
25 Lexikon – Version 1.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1995).

Die Patente US 6,372,961, WO98/12913 und WO00/00597 beschreiben die Nutzung von Hemoglobin oder strukturverwandter Proteine (Myoglobin, bakterielles Hemoglobin) zur Erhöhung der Sauerstoffassimilation in

Pflanzen. Damit soll die Keimung bzw. der Energiehaushalt der entsprechend transgenen Pflanzen verbessert sein auch unter Sauerstoffmangelbedingungen ein normales Wachstum gewährleistet werden. Auch sollen die Menge produzierter sekundärer Metabolite erhöht werden (WO98/12913 Seite 6, Zeile 24). Die Steigerung der Produktion von Speicherstoffen geht aus diesen Schriften nicht hervor.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, den Gehalt von Speicherstoffen in Speicherorganen von Pflanzen zu erhöhen, um somit eine bessere Nutzung von Anbauflächen, Dünger usw. und eine bessere Ausbeute (oder Ertrag) mittels der Pflanzen zu erwirtschaften. Insbesondere soll die Produktion von Stärke oder Öl verbessert bzw. ermöglicht werden.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß im erfindungsgemäßen Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen Leghemoglobin exprimierende transformierte Pflanzen eingesetzt werden. Die Aufgabe wird ebenfalls durch Leghemoglobin exprimierende transformierte Pflanzen sowie deren Verwendung gelöst.

Überraschenderweise konnte festgestellt werden, dass durch Expression eines Leghemoglobins Speicherstoff-haltige transformierte Pflanzen produziert werden, die auf Grund ihres (höheren) Gehalts von Speicherstoffen eine bessere Nutzung von Anbauflächen, Dünger usw. erlauben und daher einen besseren Ertrag der Speicherstoffe, insbesondere Stärke und Öl erlauben. Somit ist eine wirtschaftlich interessante Verwendung der erfindungsgemäßen Pflanzen möglich.

Das Leghemoglobin gehört zur Familie der Hemoglobin-Proteine, deren Funktion die reversible Sauerstoffbindung und Versorgung ist. Es stammt aus

Wurzelknöllchen von Hülsenfrüchten (Leguminosen) und ist eine isolierbare rote Substanz, die dem Myoglobin der Wirbeltiere ähnelt. Durch die reversible Bindung von O₂ kann Leghemoglobin den hohen Sauerstoff-Bedarf bei der Stickstoff-Fixierung durch die Knöllchenbakterien gewährleisten. Das Apoprotein wird von den Pflanzenzellen und das Häm von den Bakterien gebildet (Quelle: CD Römpf Chemie Lexikon – Version 1.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1995).

In einer weiteren bevorzugten Variante der Erfindung werden in dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen Hemoglobin oder Leghemoglobin und Hemoglobin exprimierende transformierte Pflanzen eingesetzt. Demgemäß sind Gegenstand der Erfindung auch noch Leghemoglobin und/oder Hemoglobin exprimierende transformierte Pflanzen sowie deren Verwendung.

Unter Hemoglobin werden erfindungsgemäß Eisen-II-Komplexe des Protoporphyrins verstanden.

Unter Expression wird in der vorliegenden Anmeldung die Übertragung einer genetischen Information ausgehend von DNA oder RNA in ein Genprodukt (Polypeptid oder Protein, hier Leghemoglobin oder Hemoglobin) verstanden und soll auch den Begriff der Überexpression beinhalten, womit eine verstärkte Expression gemeint ist, so dass das Fremdprotein oder das natürlich vorkommende Protein verstärkt produziert werden oder einen großen Teil des gesamten Protein-Gehaltes der Wirtszelle ausmachen.

Unter Transformation wird die Übertragung einer genetischen Information in einen Organismus, insbesondere Pflanze verstanden. Darunter sollen alle dem Fachmann bekannten Möglichkeiten zur Einschleusung der Information

fallen, z. B. Mikroinjektion, Elektroporation, Teilchenbeschuss (Partikelbombardement), Agrobakterien oder Chemikalien vermittelte Aufnahme (z. B. Polyethylenglycol-vermittelter DNA-Aufnahme oder über die Siliziumcarbonatfaser-Technik). Die genetische Information kann z. B. als
5 DNA, RNA, Plasmid und auf sonstige Weise in die Zellen eingebracht und entweder durch Rekombination ins Wirtsgenom eingebaut, in freier Form oder unabhängig als Plasmid vorliegen. Eine transformierte Pflanze im Sinne der Erfindung ist also eine gentechnisch veränderte Pflanze.

- 10 Unter Speicherstoffe werden Polysaccharide, vorzugsweise Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Polyphosphate und Polyhydroxyalkanoate, besonders bevorzugt Lichenin, Stärke, Glykogen, Polyfructosane verstanden.

Unter den aufgezählten Verbindungen werden Kohlenhydrate und Fette ganz
15 besonders bevorzugt. Höchst bevorzugt als Speicherstoffe sind Stärke und Öl.

Stärke ist dem Fachmann bekannt und es wird für weitere Informationen auf das Römpp Chemie Lexikon – CD Version 2.0, Stuttgart/New York: Georg
20 Thieme Verlag 1999, verwiesen.

"Öl" umfasst im Sinne der Erfindung neutrale und/oder polare Lipide und Mischungen derselben. Beispielhaft jedoch nicht einschränkend seien die in Tabelle 1 aufgeführten zu nennen.

Tabelle 1: Pflanzliche Lipidklassen

Neutrale Lipide	Triacylglycerol (TAG)
	Diacylglycerol (DAG)
	Monoacylglycerol (MAG)
Polare Lipide	Monogalactosyldiacylglycerol (MGDG)
	Digalactosyldiacylglycerol (DGDG)
	Phosphatidylglycerol (PG)
	Phosphatidylcholin (PC)
	Phosphatidylethanolamin (PE)
	Phosphatidylinositol (PI)
	Phosphatidylserin (PS)
	Sulfoquinovosyldiacylglycerol

- 5 Neutrale Lipide meint bevorzugt Triacylglyceride. Sowohl die neutralen als auch die polaren Lipide können ein breites Spektrum an verschiedenen Fettsäuren enthalten. Beispielfhaft jedoch nicht einschränkend seien die in Tabelle 2 aufgeführten Fettsäuren zu nennen.

Tabelle 2: Übersicht über verschiedene Fettsäuren (Auswahl)

¹ Kettenlänge:Anzahl der Doppelbindungen

* nicht natürlicherweise in Pflanzen vorkommend

5

Nomenklatur ¹	Name
16:0	Palmitinsäure
16:1	Palmitoleinsäure
16:3	Roughaninsäure
18:0	Stearinsäure
18:1	Ölsäure
18:2	Linolsäure
18:3	Linolensäure
γ -18:3	Gamma-Linolensäure*
20:0	Arachidinsäure
22:6	Docosahexanonsäure (DHA) *
20:2	Eicosadienonsäure
20:4	Arachidonsäure (AA) *
20:5	Eicosapentaenosäure (EPA) *
22:1	Erucasäure

Für weitergehende Informationen wird ebenfalls auf das Römpp Chemie Lexikon – CD Version 2.0, Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1999 verwiesen.

10

Erfindungsgemäß eignen sich alle Pflanzen zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

- "Pflanze" umfasst alle einjährigen und mehrjährige, monokotyledonen und dikotyledonen Pflanzen und schließt beispielhaft jedoch nicht einschränkend solche der Gattungen Cucurbita, Rosa, Vitis, Juglans, Fragaria, Lotus, Medicago, Onobrychis, Trifolium, Trigonella, Vigna, Citrus, Linum, Geranium, Manihot, Daucus, Arabidopsis, Brassica, Raphanus, Sinapis, Atropa, Capsicum, Datura, Hyoscyamus, Lycopersicon, Nicotiana, Solarium, Petunia, Digitalis, Majorana, Cichorium, Helianthus, Lactuca, Bromus, Asparagus, Antirrhinum, Heterocallis, Nemesis, Pelargonium, Panieum, Pennisetum, Ranunculus, Senecio, Salpiglossis, Cucumis, Browaalia, Glycine, Pisum, Phaseolus, Lolium, Oryza, Zea, Avena, Hordeum, Secale, Triticum, Sorghum, Picea und Populus ein.

- Bevorzugt sind Pflanzen nachfolgender Pflanzenfamilien: Amaranthaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Carophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Cruciferae, Cucurbitaceae, Labiatae, Leguminosae, Papilionoideae, Liliaceae, Linaceae, Malvaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Sterculiaceae, Tetragoniaceae, Theaceae, Umbelliferae.

- Bevorzugte monokotyle Pflanzen sind insbesondere ausgewählt aus den monokotylen Kulturpflanzen, wie zum Beispiel der Familie der Gramineae wie Reis, Mais, Weizen oder andere Getreidearten wie Gerste, Hirse, Roggen, Triticale oder Hafer sowie dem Zuckerrohr sowie alle Arten von Gräsern.

- Die Erfindung wird ganz besonders bevorzugt aus dikotyledone pflanzliche Organismen angewendet. Bevorzugte dikotyle Pflanzen sind insbesondere ausgewählt aus den dikotylen Kulturpflanzen, wie zum Beispiel

- Asteraceae wie Sonnenblume, Tagetes oder Calendula und andere mehr,

- Compositae, besonders die Gattung Lactuca, ganz besonders die Art sativa (Salat) und andere mehr,
- 5 - Cruciferae, besonders die Gattung Brassica, ganz besonders die Arten napus (Raps), campestris (Rübe), oleracea cv Tastie (Kohl), oleracea cv Snowball Y (Blumenkohl) und oleracea cv Emperor (Broccoli) und weitere Kohlarten; und der Gattung Arabidopsis, ganz besonders die Art thaliana sowie Kresse oder Canola und andere mehr,
- 10 - Cucurbitaceae wie Melone, Kürbis oder Zucchini und andere mehr,
- Leguminosae besonders die Gattung Glycine, ganz besonders die Art max (Sojabohne) Soja sowie Alfalfa, Erbse, Bohnengewächsen oder Erdnuss und andere mehr
- 15 - Rubiaceae, bevorzugt der Unterklasse Lamiidae wie beispielsweise Coffea arabica oder Coffea liberica (Kaffeestrauch) und andere mehr,
- Solanaceae besonders die Gattung Lycopersicon, ganz besonders die Art
- 20 esculentum (Tomate) und die Gattung Solanum, ganz besonders die Art tuberosum (Kartoffel) und melongena (Aubergine) sowie Tabak oder Paprika und andere mehr,
- Sterculiaceae, bevorzugt der Unterklasse Dilleniidae wie beispielsweise
- 25 Theobroma cacao (Kakaostrauch) und andere mehr,
- Theaceae, bevorzugt der Unterklasse Dilleniidae wie beispielsweise Camellia sinensis oder Thea sinensis (Teestrauch) und andere mehr,

- Umbelliferae, besonders die Gattung *Daucus* (ganz besonders die Art *carota* (Karotte)) und *Apium* (ganz besonders die Art *graveolens dulce* (Selderie)) und andere mehr; und die Gattung *Capsicum*, ganz besonders die Art *annuum* (Pfeffer) und andere mehr,
- 5 sowie Lein, Soja, Baumwolle, Hanf, Flachs, Gurke, Spinat, Möhre, Zuckerrübe und den verschiedenen Baum-, Nuss- und Weinarten, insbesondere Banane und Kiwi.
- 10 Umfasst sind ferner Schmuckpflanzen, Nutz- oder Zierbäume, Blumen, Schnittblumen, Sträucher oder Rasen. Beispielhaft aber nicht einschränkend seien zu nennen Angiospermen, Bryophyten wie zum Beispiel Hepaticae (Leberblümchen) und Musci (Moose); Pteridophyten wie Farne, Schachtelhalm und Lycopoden; Gymnospermen wie Koniferen, Cycaden,
- 15 Ginkgo und Gnetales, die Familien der Rosaceae wie Rose, Ericaceae wie Rhododendrons und Azaleen, Euphorbiaceae wie Weihnachtssterne und Krokus, Caryophyllaceae wie Nelken, Solanaceae wie Petunien, Gesneriaceae wie das Usambaraveilchen, Balsaminaceae wie das Springkraut, Orchidaceae wie Orchideen, Iridaceae wie Gladiolen, Iris,
- 20 Freesie und Krokus, Compositae wie Ringelblume, Geraniaceae wie Geranien, Liliaceae wie der Drachenbaum, Moraceae wie Ficus, Araceae wie Philodendron und andere mehr.
- Pflanzliche Organismen im Sinne der Erfindung sind weiterhin weitere
- 25 photosynthetisch aktive befähigte Organismen, wie zum Beispiel Algen, Cyanobakterien sowie Moose. Bevorzugte Algen sind Grünalgen, wie beispielsweise Algen der Gattung *Haematococcus*, *Phaedactylum tricornutum*, *Volvox* oder *Dunaliella*. Insbesondere bevorzugt ist *Synechocystis*.

- Am meisten bevorzugt sind Ölpflanzen, d.h. Pflanzen, die bereits natürlicherweise einen hohen Ölgehalt aufweisen und/oder zu industriellen Gewinnung von Ölen verwendet werden. Diese Pflanzen können einen hohen Ölgehalt und/oder aber eine besondere, industriell interessante Fettsäurezusammensetzung aufweisen. Bevorzugt sind Pflanzen, die einen Lipidanteil von mindestens 1 Gew.% aufweisen. Ölpflanzen umfassen beispielhaft: *Bovago officinalis* (Borretsch); *Brassica* Arten wie *B. campestris*, *B. napus*, *B. rapa* (Senf oder Raps); *Cannabis sativa* (Hanf); *Curthamus tinctorius* (Färberdiestel); *Cocos nucifera* (Kokusnuss); *Crambe abyssinica* (Krambe); *Cuphea* Arten (Cuphea Arten liefern fettsäuren von mittlerer Kettenlänge insbesondere für industrielle Anwendungen); *Elaeis guinensis* (Afrikanische Ölpalme); *Ekeis oleiferu* (Amerikanische Ölpalme); *Glycine max* (Sojabohne); *Gossypium hirsutum* (Amerikanische Baumwolle); *Gossypium barbadense* (Ägyptische Baumwolle); *Gossypium herbaceum* (Asiatische Baumwolle Cotton); *Helianthus annuus* (Sonnenblume); *Linum usitatissimum* (Lein oder Flachs); *Oenethem biennis* (Evening primrose); *Ozea europea* (Olive); *Oryza sativa* (Rice); *Ricinus communis* (Castor); *Sesamum indicum* (Sesam); *Glycine max* (Sojabohne); *Triticum* Arten (Weizen); *Zea maize* (Mais) sowie verschiedene Nussarten wie beispielsweise Walnuss oder Mandel.

- Wenn es sich bei den verwendeten Pflanzen um solche zur Gattung der Leguminosen (Hülsenfrüchte) gehörenden Pflanzen handelt, so fällt unter die Erfindung die Expression von Fremdproteinen (Leghemoglobinen, Hemoglobin), d. h. in der Natur nicht-symbiontisch vorkommenden Leghemoglobinen und/oder Hemoglobinen oder die Veränderung der Pflanzen derart, dass sie das natürlich vorkommende Leghemoglobin überexprimieren.

Höchst bevorzugt sind Kartoffeln, *Arabidopsis thaliana* und Raps.

Vorteilhaft ist es, wenn die vorgenannten Pflanzen ein Leghemoglobin und/oder Hemoglobin ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Leghemoglobin und/oder Hemoglobin aus den Pflanzen *Lupinus luteus* (LGB1_LUPLU, LGB2_LUPLU), *Glycine max* (LGBA_SOYBN, LGB2_SOYBN, LGB3_SOYBN), *Medicago sativa* (LGB1-4_MEDSA), *Medicago trunculata* (LGB1_MEDTR), *Phaseolus vulgaris* (LGB1_PHAVU, LGB2_PHAVU), *Vicia faba* (LGB1_VICFA, LGB2_VICFA), *Pisum sativum* (LGB1_PEA, LGB2_PEA), *Vigna unguiculata* (LGB1_VIGUN), *Lotus japonicus* (LGB_LOTJA), *Psophocarpus tetragonolobus* (LGB_PSOTE), *Sesbania rostrata* (LGB1_SESRO), *Casuarina glauca* (HBPA_CASGL) und *Canvalaria lineata* (HBP_CANLI) *Physcomitrella patens* (HBL0_PHYPA), *Arabidopsis thaliana* (HBL1_ARATH, HBL2_ARATH), *Gossypium hirsutum* (HBL1_GOSHI, HBL2_GOSHI), *Medicago sativa* (HBL1_MEDSA), *Oryza sativa* (HBL1_ORYSA, HBL2_ORYSA, HBL3_ORYSA, HBL4_ORYSA), *Brassica napus* (HBL2_BRANA), *Lycopersicon esculentum* (HBL2_LYCES), *Hordeum vulgare* (HBL_HORVU), *Zea mays* (HBL_MAIZE), *Trema tomentosa* (HBL_TRETO), *Casuarina glauca* (HBP1_CASGL, HBP2_CASGL, HBPA_CASGL), *Parasponia rigida* (HBPL_PARAD) exprimieren. In Klammern sind die jeweiligen Swiss-Prot Datenbankeinträge vermerkt.

Besonders vorteilhaft sind Pflanzen, die die Sequenz Nr. 1 codierend für Leghemoglobin und/oder die Sequenzen Nr. 3 und/oder 5 codierend für Hemoglobin aufweisen. Bevorzugterweise wird Leghemoglobin und/oder Hemoglobin aus *Lotus japonicus* eingesetzt. Dann produzieren die transformierten Pflanzen Speicherstoffe in erhöhtem Ausmaß.

Unter die Erfindung fallen auch Pflanzen, die zur Produktion von Speicherstoffen ein Leghemoglobin, gemäß Sequenz Nr. 1 und/oder ein Hemoglobin gemäß Sequenzen Nr. 3 und 5 exprimieren.

- 5 In einer bevorzugten Variante der Erfindung handelt es sich um Pflanzen, die das Leghemoglobin und/oder Hemoglobin speicherorganspezifisch exprimieren.

- Die genannten Pflanzen lagern die Speicherstoffe in der Regel in bestimmten
- 10 Organen ab. Dies sind z. B. Zwiebeln, Knollen, Samen, Körner, Nüsse, Blätter usw. Unter Speicherorgane im Sinne der Erfindung sind auch Früchte zu verstehen. Früchte sind die Sammelbezeichnung für die den Samen als Nährgewebe umhüllenden Organe der Pflanzen. Dabei ist nicht nur an die eßbaren Früchte, insbesondere an das Obst, aber auch an Hülsenfrüchte,
- 15 Getreide, Nüsse, Gewürze zu denken, sondern auch an offiziell genutzte Drogen (s. Fructus, Semen). Natürlich kann auch eine Speicherung der Speicherstoffe in der gesamten Pflanze stattfinden.

- Bevorzugterweise wird das Leghemoglobin und/oder Hemoglobin
- 20 knollenspezifisch oder samenspezifisch exprimiert.

- Als Pflanzen kommen alle zuvor genannten in Betracht. Bevorzugt werden Kartoffeln, Arabidopsis thaliana, Raps, Sojabohnen, Erdnüsse, Mais, Maniok, Yams, Reis, Sonnenblumen, Roggen, Gerste, Hopfen, Hafer, Hart und
- 25 Weichweizen, Lupinen, Erbsen, Klee, Rüben, Kohl, Reben usw. wie sie z. B. aus der Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz (Blatt für PMZ 1986 S. 3, zuletzt geändert Blatt für PMZ 2002 S. 68) entnehmbar sind, eingesetzt.

Es ist besonders bevorzugt, wenn es sich um knollenproduzierende Pflanzen, insbesondere Kartoffel-Pflanzen oder um samenproduzierende Pflanzen, insbesondere *Arabidopsis thaliana*, Raps oder Soja handelt.

- 5 Die gewebespezifische Expression kann z. B. durch Verwendung eines gewebespezifischen Promotors erreicht werden. Eine solche gewebespezifische Expression ist beispielsweise bekannt aus der US 6,372,961 B1 Spalte 11, Zeilen 44 ff.
- 10 Gegenstand der Erfindung ist ferner eine Nukleotidsequenz gemäß Sequenz Nr. 1 codierend für Leghemoglobin zur Verwendung in einer Pflanze und eine entsprechende Genstruktur oder Vektor sowie deren Verwendung zur Transformierung einer Pflanze mit der Erfindung.
- 15 Insbesondere fällt unter die Erfindung auch die Verwendung einer Leghemoglobin codierenden Nukleotidsequenz, die mit der Sequenz Nr. 1 zu ca. 70 %, bevorzugt 80%, besonders bevorzugt 85%, 90%, insbesondere 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% oder 99% identisch ist.
- 20 Gegenstand der Erfindung sind außerdem Nukleotidsequenzen gemäß Nr. 3 und 5 kodierend für Hemoglobin zur Verwendung in einer Pflanze und eine entsprechende Genstruktur oder -vektor sowie deren Verwendung zur Transformierung einer Pflanze. Insbesondere fallen unter die Erfindung auch die Verwendung von Hemoglobin kodierenden Nukleotidsequenzen, die mit
25 den Sequenzen 3 und 5 zu ca. 70%, bevorzugt 80%, besonders bevorzugt 85%, 90%, insbesondere 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% oder 99% identisch sind.

Unter Nukleotidsequenz werden alle Nukleotidsequenzen verstanden, die (i) exakt den dargestellten Sequenzen entsprechen; oder (ii) mindestens eine Nukleotidsequenz umfassen, die innerhalb des Bereichs der Degeneration des genetischen Codes den dargestellten Sequenzen entspricht; oder (iii) mindestens eine Nukleotidsequenz umfasst, die mit einer zur Nukleotidsequenz (i) oder (ii) komplementären Nukleotidsequenz hybridisiert, und gegebenenfalls (iiii) funktionsneutrale Sinnmutationen in (i) umfasst. Dabei bedeutet der Begriff "funktionsneutrale Sinnmutationen" den Austausch chemisch ähnlicher Aminosäuren, wie z. B. Glycin durch Alanin oder Serin durch Threonin.

Erfindungsgemäß sind auch die den kodierenden Bereichen (Strukturgenen) vorausgehenden (5'-oder upstream) und/oder nachfolgenden (3'-oder downstream) Sequenzbereiche eingeschlossen. Insbesondere sind hierin Sequenzbereiche mit regulatorischer Funktion inbegriffen. Sie können die Transkription, die RNA-Stabilität oder das RNA Processing sowie die Translation beeinflussen. Beispiele für regulatorische Sequenzen sind u. a. Promotoren, Enhancer, Operatoren, Terminatoren oder Translationsverstärker.

Unter die jeweiligen Proteine (Leghemoglobine und/oder Hemoglobine) fallen auch Isoformen, die als Proteine mit gleicher oder vergleichbarer Wirkung verstanden werden, die jedoch eine unterschiedliche Primärstruktur aufweisen.

Unter modifizierten Formen sind erfindungsgemäß Proteine zu verstehen, bei denen Änderungen in der Sequenz, beispielsweise am N- und/oder C-Terminus des Polypeptids oder im Bereich konservierter Aminosäuren vorliegen, ohne jedoch die Funktion des Proteins zu beeinträchtigen. Diese

Veränderungen können in Form von Aminosäureaustauschen nach bekannten Methoden vorgenommen werden.

Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die folgenden Versuche
5 beispielhaft beschrieben.

Beispiele

1. Modellorganismen

10 Als Modellorganismen für die Experimente wurden Kartoffel und *Arabidopsis thaliana* eingesetzt. Beide Pflanzenarten repräsentieren ein Mitglied der höheren Pflanzen (Samenpflanzen). Sie können aufgrund des hohen Grades an Homologie ihrer DNA-Sequenzen bzw. Polypeptidsequenzen als Modellpflanzen für andere Pflanzenarten eingesetzt werden.

15

2. Allgemeine Verfahren

a) Anzucht von Kartoffel oder *Arabidopsis* Pflanzen

Arabidopsis Pflanzen wurden entweder auf Murashige-Skoog Medium mit 0,5 % Saccharose (Ogas et al., 1997 Science 277:91-94) oder auf Erde gezogen
20 (Focks & Benning, 1998 Plant Physiology 118:91-101). Um einheitliche Keimungs- und Blühzeiten zu erreichen, wurden die Samen nach Ausplattieren bzw. Ausstreuen auf Erde zwei Tage bei 4 °C stratifiziert. Nach der Blüte wurden die Schoten markiert. Entsprechend der Markierungen wurden dann Schoten mit einem Alter von 6-20 Tagen nach der Blüte
25 geerntet. Kartoffelpflanzen wurden nach Dietze et al., 1995 (Gene Transfer to Plants, ed. Potrykus und Spangenberg, Springer Lab Manual, Berlin, Heidelberg, 24-29) angezogen.

b) Isolierung von totalRNA und poly-A⁺ RNA aus Pflanzen

Für die Herstellung von Expressionskonstrukten wird RNA bzw. polyA⁺ RNA isoliert. RNA wurde aus Schoten von Arabidopsis oder aus Knollen von Kartoffel bzw. Wurzeln von Lotus japonicus nach folgender Vorschrift isoliert:

- 5 Pflanzenmaterial im Alter von 6 - 40 Tage wurde geerntet und in flüssigem Stickstoff schockgefroren. Das Material wurde vor der weiteren Verwendung bei -80 °C gelagert. 75 mg des Materials wurden im gekühlten Mörser zu einem feinen Pulver gemahlen und mit 200 µL des Lysis-Puffers aus dem Ambion RNAqueos-Kit versetzt. Die Isolierung der totalen RNA wurde dann
- 10 nach Herstellerangaben durchgeführt. Die RNA wurde mit 50 µL Elutionspuffer (Ambion) eluiert und die Konzentration durch Absorption einer 1.100 verdünnten Lösung am Photometer (Eppendorf) bei 260 nm bestimmt. 40ug/ml RNA entspricht dabei einer Absorption von 1. Die RNA-Lösungen wurden mit RNase freiem Wasser auf eine Konzentration von 1 µg/µL
- 15 eingestellt. Die Konzentrationen wurden durch Agarosegelelektrophorese überprüft.

- Zur Isolierung von polyA⁺ RNA wurde oligo(dT)-Zellulose von Amersham Pharmacia nach Herstellerangaben verwendet. RNA bzw. polyA⁺ RNA wurde
- 20 bei -70 °C gelagert.

3. Konstruktion der cDNA-Bank

- Zur Konstruktion der cDNA-Bank aus Lotus japonicus- bzw. Arabidopsis thaliana-RNA wurde die Erststrangsynthese unter Verwendung von Reverser
- 25 Transkriptase aus Maus-Leukämie-Virus (Clontech) und Oligo-d(T)-Primern, die Zweitstrangsynthese durch Inkubation mit DNA-Polymerase I, Klenow-Enzym und RNase H-Spaltung bei 12 °C (2 Std.), 16 °C (1 Std.) und 22 °C (1 Std.) erzielt. Die Reaktion wurde durch Inkubation bei 65 °C (10 min)

gestoppt und anschließend auf Eis überführt. Doppelsträngige DNA-Moleküle wurde mit T4-DNA-Polymerase (Roche, Mannheim) bei 37 °C (30 min) mit glatten Enden versehen. Die Nukleotide wurden durch Phenol/Chloroform-Extraktion und Sephadex-G50-Zentrifugiersäulen entfernt. EcoRI/NotI-Adapter (Pharmacia, Freiburg, Deutschland) wurden mittels T4-DNA-Ligase (Roche, 12°C, über Nacht) an die cDNA-Enden ligiert, mit NotI nachgeschnitten und durch Inkubation mit Polynukleotidkinase (Roche, 37 °C, 30 min) phosphoryliert. Dieses Gemisch wurde der Trennung auf einem Low-Melting-Agarose-Gel unterworfen. DNA-Moleküle über 200 Basenpaaren wurden aus dem Gel eluiert, Phenol-extrahiert, auf Elutip-D-Säulen (Schleicher und Schüll, Dassel, Deutschland) konzentriert und in den Klonierungsvektor pSPORT1 (Invitrogen, Karlsruhe) ligiert, wobei Material des Herstellers verwendet und seine Anweisungen befolgt wurden.

4. DNA-Sequenzierung und Computeranalyse

cDNA-Banken, wie unter Punkt 2 beschrieben, wurden zur DNA-Sequenzierung nach Standardverfahren, insbesondere durch das Kettenterminationsverfahren unter Verwendung des ABI PRISM Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction-Kit (Perkin-Elmer, Weiterstadt, Deutschland), verwendet. Die Sequenzierung zufälliger, vereinzelter Klone wurde anschließend an die präparative Plasmidgewinnung aus cDNA-Banken über in vivo-Massenexcision und Retransformation von DH5 α auf Agarplatten durchgeführt (Einzelheiten zu Material und Protokoll von Stratagene, Amsterdam, Niederlande). Plasmid-DNA wurde aus über Nacht gezüchteten E. coli-Kulturen, die in Luria-Brühe mit Ampicillin (siehe Sambrook et al. (1989) (Cold Spring Harbor Laboratory Press: ISBN 0-87969-309-6)) gezüchtet worden waren, an einem Qiagen-DNA-Präparations-Roboter (Qiagen, Hilden) nach den Protokollen des Herstellers präpariert.

Die Sequenzen wurden unter Verwendung des Standard-Softwarepakets EST-MAX, das kommerziell von Bio-Max (München, Deutschland) geliefert wird, prozessiert und annotiert. Durch Nutzung von Vergleichsalgorithmen und unter Verwendung einer Suchsequenz wurde mithilfe des BLAST-Programms nach homologen Genen gesucht (Altschul et al. (1997) "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402).

5. Herstellung der Expressionskonstrukte für die knollenspezifische Expression in Kartoffel bzw. die samenspezifische Expression in Arabidopsis:

a) Knollenspezifische Expression:

Das Leghemoglobin-Gen Ljlb wurde aus dem Vektor pSport1 mit NotI und KpnI geschnitten, wobei die NotI Schnittstelle durch Inkubation mit Klenow-Enzym aufgefüllt wurde. Für die Ligation in den Vektor pART33 wurde dieser mit BamHI verdaut, dann die Schnittstelle durch Inkubation mit Klenow-Enzym aufgefüllt und anschliessend mit KpnI verdaut. pART33 enthält bereits den B33-Promoter (1459 bp; Liu XJ, Prat S, Willmitzer L, Frommer WB (1990) cis regulatory elements directing tuber-specific and sucrose-inducible expression of a chimeric class I patatin promoter/GUS-gene fusion. Mol Gen Genet. 223(3):401-6) sowie den OCS-Terminator (766 bp) für die knollenspezifische Expression. Das gesamte Konstrukt wurde mit NotI aus pART33 geschnitten und in den Vektor für die Pflanzentransformation pART27 einkloniert.

25

b) Samenspezifische Expression:

Das Leghemoglobin-Gen Ljlb wurde aus dem Vektor pART33 in den Vektor pBINUSP umklont. Zu diesem Zweck wurde das Konstrukt pART33-LegHb zunächst mit Asp718I verdaut und die Überhänge mit Klenow-Fragment

aufgefüllt. Anschließend wurde das linearisierte Konstrukt mit XbaI-verdaut und das so gewonnene Gen über Nacht bei 4 °C in den XbaI/SmaI-geschnittenen pBINUSP ligiert.

- Das Hemoglobin-Gen1 AtHb1 wurde aus dem Vektor pART33 in den Vektor pBINUSP umkloniert. Zu diesem Zweck wurde das Konstrukt pART33-AtHb1
5 zunächst mit Asp718I verdaut und die Überhänge mit Klenow-Fragment aufgefüllt. Anschließend wurde das linearisierte Konstrukt mit XbaI-verdaut und das so gewonnene Gen über Nacht bei 4 °C in den XbaI/SmaI-geschnittenen pBINUSP ligiert.
- 10 Das Hemoglobin-Gen2 AtHb2 wurde aus dem Vektor pART33 in den Vektor pBINUSP umkloniert. Zu diesem Zweck wurde das Konstrukt pART33-AtHb2 zunächst mit Asp718I verdaut und die Überhänge mit Klenow-Fragment aufgefüllt. Anschließend wurde das linearisierte Konstrukt mit XbaI-verdaut und das so gewonnene Gen über Nacht bei 4 °C in den XbaI/SmaI-geschnittenen pBINUSP ligiert.
- 15

6. Plasmide für die Pflanzentransformation

- Zur Pflanzentransformation können binäre Vektoren, wie pBIN verwendet werden (Bevan, M., Nucleic Acids Res. 12 (1984), 8711–8721). Die
20 Konstruktion der binären Vektoren kann durch Ligation der cDNA in Sense- oder Antisense-Orientierung in T-DNA erfolgen. 5' der cDNA aktiviert ein Pflanzenpromotor die Transkription der cDNA. Eine Polyadenylierungssequenz befindet sich 3' von der cDNA.

- Die gewebespezifische Expression läßt sich unter Verwendung eines
25 gewebespezifischen Promotors erzielen. Beispielsweise kann die samenspezifische Expression erreicht werden, indem der Napin- oder der LeB4- oder der USP-Promotor 5' der cDNA einkloniert wird. Auch jedes andere samenspezifische Promotorelement kann verwendet werden. Zur

konstitutiven Expression in der ganzen Pflanzen lässt sich der CaMV-35S-Promotor verwenden.

7. Transformation von Agrobacterium und Pflanzentransformation

Die Agrobacterium-vermittelte Pflanzentransformation kann zum Beispiel
5 unter Verwendung des GV3101- (pMP90-) (Koncz und Schell, Mol. Gen. Genet. 204 (1986) 383-396) oder LBA4404- (Clontech) Agrobacterium tumefaciens-Stamms durchgeführt werden. Die Transformation des Bakteriums kann durch dem Fachmann bekannte Standard-Transformationstechniken durchgeführt werden (Deblaere et al., Nucl. Acids.
10 Tes. 13 (1984), 4777-4788).

Die Agrobacterium-vermittelte Pflanzentransformation selbst kann unter Verwendung von dem Fachmann ebenfalls bekannte Standard-Transformations- und Regenerationstechniken durchgeführt werden (Gelvin,
15 Stanton B., Schilperoort, Robert A., Plant Molecular Biology Manual, 2. Aufl., Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 1995, in Sect., Ringbuc Zentrale Signatur: BT11-P ISBN 0-7923-2731-4; Glick, Bernard R., Thompson, John E., Methods in Plant Molecular Biology and Biotechnology, Boca Raton: CRC Press, 1993, 360 S., ISBN 0-8493-5164-2).

20

Die Transformation mittels Agrobacterium von *Arabidopsis thaliana* wurde nach der Methode von Bechthold et al., 1993 (C.R. Acad. Sci. Ser. III Sci. Vie., 316, 1194-1199) durchgeführt. Die Methode wurde dahingegen modifiziert, dass auf die Vakuuminfiltration verzichtet wurde.

25

Für die Transformation wurden *Arabidopsis thaliana* Col0 Samen auf befeuchteter Erde ausgesät, zwei Tage bei 4 °C stratifiziert und 4-6 Wochen unter Kurztagbedingungen (8 h Licht, 21 °C) angezogen. Die Pflanzen wurden dann zur Blühinduktion in Langtagbedingungen (16 h Licht, 21 °C)

- überführt. Nach etwa 10 Tagen ist die Infloreszenz (Blütenstand) gross genug für das Eintauchen. Die Infloreszenz wird in eine *Agrobacterium* Suspension mit ½ MS Lösung (Murashige und Skoog, s.u.) pH 5,7, 5 % Saccharose, 44 µM Benzylaminopurin (Sigma) und 0,03 % Silwet L-77 (Lehle Seeds, USA) getaucht. Die optische Dichte der *Agrobacterium* Suspension bei 600 nm sollte 0,8 betragen. Die Bakterien werden zuvor im YEB Medium (0,5 % Bactotrypton, 0,5 % Bactopeptone, 0,1 % Hefeextrakt, 0,5 % Saccharose und 2mM MgCl₂) angezogen.
- 10 Nach Eintauchen der Pflanzen wurden diese für etwa drei Wochen weiter befeuchtet. Dann wurde die Bewässerung eingestellt und die Pflanzen trockneten für die Samengewinnung ab. Die erhaltenen Samen wurden auf Platten mit ½ MS Lösung, pH 5,7, 50 µg Kanamycin, 250 µg Timenten und 0,8 % Agar ausgelegt. Resistente Keimlinge wurden vereinzelt und auf Erde
- 15 pikiert.

- Die Transformation von Kartoffel (*Solanum tuberosum* L.) erfolgte nach der Methode von Dietze et al. in Gene transfer to plants (eds. I. Potrykus and G. Spangenberg, Springer Lab Manual, 1995, S. 24-29). Als Ausgangsmaterial
- 20 wurde die Sorte Desiree verwendet.

- Zur Transformation wurden fünf bis sechs Blätter einer sterilen Sprossen-Kultur der Kartoffelvarietät Desiree vorsichtig in 10 ml einer 2 MS Lösung (Standard MS Medium nach Murashige and Skoog (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant.*, 15, 473-497.) mit zusätzlich 2 % Saccharose equilibriert. Aus den Blättern
- 25 werden vertikal zur Mittelrippe 1 - 2 mm lange Stücke herausgeschnitten und in frisches 2 MS Medium gegeben. Zu dem frischen Medium werden 50 µl einer *Agrobacterium*-Lösung zugegeben, die mit dem T-Plasmid pART27-JpLeg transformiert wurden. Die *Agrobacterium*-Lösung wird über die

- Blattstücke verteilt und die Platten werden für zwei Tage im Dunkeln bei 22 - 24 °C inkubiert. Nach zwei Tagen werden die Blattstücke auf CIM Medium (MS Medium mit 1,5 % Glucose, 5 mg/l NAA, 0,1 mg/l BAP, 250 mg/l Claforin und 50 mg/l Kanamycin oder Hygromycin) umgesetzt und 7 Tage inkubiert.
- 5 Dann werden die Blattstücke auf SIM Medium (MS Medium mit 2 mg/l Zeatin, 0,02 mg/l NAA, 0,02 mg/l GA3, 250 mg/l Claforin und 50 mg/l Kanamycin oder Hygromycin) umgesetzt. Nach 1 - 2 Wochen können dann die entstandenen transgenen Sprosse (1 - 1,5 cm lang) abgeschnitten und auf RIM Medium (MS Medium mit 250 mg/l Claforin) umgesetzt werden. Nach 3 -
- 10 4 Wochen haben die Sprossen Blätter und Wurzel ausgebildet und die Pflanzen können auf Erde pikiert werden.

Entsprechend dieser Methode können 2 - 3 unabhängige transgene Linien pro eingesetztes Blatt erhalten werden.

15

- Die alternativ mögliche Pflanzentransformation unter Verwendung von Teilchenbeschuß, Polyethylenglycol-vermittelter DNA-Aufnahme oder über die Siliziumcarbonatfaser-Technik ist beispielsweise beschrieben von Freeling und Walbot "The maize handbook" (1993) ISBN 3-540-97826-7,
- 20 Springer Verlag New York).

8. Untersuchung der Expression des Leghemoglobins und Hemoglobins in der transformierten Pflanze

- Die Aktivität des Leghemoglobins in den transformierten Pflanzen wurde auf
- 25 der Transkriptionsebene gemessen.

Ein geeignetes Verfahren zur Bestimmung der Menge an Transkription des Gens (ein Hinweis auf die Menge an RNA, die für die Translation des Genproduktes zur Verfügung steht) ist die Durchführung eines Northern-Blots

wie unten ausgeführt (als Bezugsstelle siehe Ausubel et al. (1988) Current Protocols in Molecular Biology, Wiley: New York, oder den oben erwähnten Beispielteil), wobei ein Primer, der so gestaltet ist, daß er an das Leghemoglobin bindet, mit einer nachweisbaren Markierung (gewöhnlich
5 radioaktiv oder chemilumineszent) markiert wird, so daß, wenn die Gesamt-RNA einer Kultur des Organismus extrahiert, auf einem Gel aufgetrennt, auf eine stabile Matrix transferiert und mit dieser Sonde inkubiert wird, die Bindung und das Ausmaß der Bindung der Sonde das Vorliegen und auch die Menge der mRNA für dieses Gen (Leghemoglobin bzw. Hemoglobin) anzeigt.
10 Diese Information zeigt den Grad der Transkription des transformierten Gens an. Zelluläre Gesamt-RNA kann aus Zellen, Geweben oder Organen mit mehreren Verfahren, die alle im Fachgebiet bekannt sind, wie zum Beispiel das von Bormann, E. R., et al. (1992) Mol. Microbiol. 6:317-326 beschriebene, präpariert werden.

15

Northern-Hybridisierung:

Für die RNA-Hybridisierung wurden 20 µg Gesamt-RNA oder 1 µg poly(A)⁺-RNA mittels Gelelektrophorese in Agarosegelen mit einer Stärke von 1,25 % unter Verwendung von Formaldehyd, wie beschrieben in Amasino (1986,
20 Anal. Biochem. 152, 304) aufgetrennt, mittels Kapillaranziehung unter Verwendung von 10 x SSC auf positiv geladene Nylonmembranen (Hybond N+, Amersham, Braunschweig) übertragen, mittels UV-Licht immobilisiert und 3 Stunden bei 68 °C unter Verwendung von Hybridisierungspuffer (10 % Dextransulfat Gew./Vol., 1 M NaCl, 1 % SDS, 100 mg Heringssperma-DNA)
25 vorhybridisiert. Die Markierung der DNA-Sonde mit dem Highprime DNA Labeling-Kit (Roche, Mannheim, Deutschland) erfolgte während der Vorhybridisierung unter Verwendung von alpha-³²P-dCTP (Amersham Pharmacia, Braunschweig, Deutschland). Die Hybridisierung wurde nach Zugabe der markierten DNA-Sonde im gleichen Puffer bei 68 °C über Nacht

durchgeführt. Die Waschschrirte wurden zweimal für 15 min unter Verwendung von 2 X SSC und zweimal für 30 min unter Verwendung von 1 X SSC, 1 % SDS, bei 68 °C durchgeföhrt. Die Exposition der verschlossenen Filter wurde bei -70 °C für einen Zeitraum von 1 bis 14 Tagen durchgeföhrt.

5

9. Analyse der Auswirkung des rekombinanten Leghemoglobins auf die Produktion des gewünschten Produktes

Die Auswirkung der genetischen Modifikation in Pflanzen, Pilzen, Algen, Ciliaten oder auf die Produktion einer gewünschten Verbindung (wie einer Fettsäure) kann bestimmt werden, indem die modifizierten Mikroorganismen oder die modifizierte Pflanze unter geeigneten Bedingungen (wie den vorstehend beschriebenen) gezüchtet werden und das Medium und/oder die zellulären Komponenten auf die erhöhte Produktion des gewünschten Produktes (d.h. von Lipiden oder Kohlenhydrate) untersucht wird. Diese

10 Analysetechniken sind dem Fachmann bekannt und umfassen Spektroskopie, Dünnschichtchromatographie, Färbeverfahren verschiedener Art, enzymatische und mikrobiologische Verfahren sowie analytische Chromatographie, wie Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (siehe beispielsweise Ullman, Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. A2, S. 89-90

15 und S. 443-613, VCH: Weinheim (1985); Fallon, A., et al., (1987) "Applications of HPLC in Biochemistry" in: Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology, Bd. 17; Rehm et al. (1993) Biotechnology, Bd. 3, Kapitel III: "Product recovery and purification", S. 469-714, VCH: Weinheim; Belter, P.A., et al. (1988) Bioseparations: downstream

20 processing for Biotechnology, John Wiley and Sons; Kennedy, J.F., und Cabral, J.M.S. (1992) Recovery processes for biological Materials, John Wiley and Sons; Shaeiwitz, J.A., und Henry, J.D. (1988) Biochemical Separations, in: Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Bd. B3;

25

Kapitel 11, S. 1-27, VCH: Weinheim; und Dechow, F.J. (1989) Separation and purification techniques in biotechnology, Noyes Publications).

- Neben den oben erwähnten Verfahren werden Pflanzenlipide aus Pflanzenmaterial wie von Cahoon et al. (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96 (22):12935-12940, und Browse et al. (1986) Analytic Biochemistry 152:141-145, beschrieben extrahiert. Die qualitative und quantitative Lipid- oder Fettsäureanalyse ist beschrieben bei Christie, William W., Advances in Lipid Methodology, Ayr/Scotland: Oily Press (Oily Press Lipid Library; 2); Christie, William W., Gas Chromatography and Lipids. A Practical Guide - Ayr, Scotland: Oily Press, 1989, Repr. 1992, IX, 307 S. (Oily Press Lipid Library; 1); "Progress in Lipid Research, Oxford: Pergamon Press, 1 (1952) - 16 (1977) u.d.T.: Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids CODEN.
- 15 Zusätzlich zur Messung des Endproduktes der Fermentation ist es auch möglich, andere Komponenten der Stoffwechselwege zu analysieren, die zur Produktion der gewünschten Verbindung verwendet werden, wie Zwischen- und Nebenprodukte, um die Gesamteffizienz der Produktion der Verbindung zu bestimmen. Die Analyseverfahren umfassen Messungen der Nährstoffmengen im Medium (z.B. Zucker, Kohlenwasserstoffe, Stickstoffquellen, Phosphat und andere Ionen), Messungen der Biomassezusammensetzung und des Wachstums, Analyse der Produktion üblicher Metabolite von Biosynthesewegen und Messungen von Gasen, die während der Fermentation erzeugt werden. Standardverfahren für diese Messungen sind in Applied Microbial Physiology; A Practical Approach, P.M. Rhodes und P.F. Stanbury, Hrsgb., IRL Press, S. 103-129; 131-163 und 165-192 (ISBN: 0199635773) und darin angegebenen Literaturstellen beschrieben.

Ein Beispiel ist die Analyse von Fettsäuren (Abkürzungen: FAME, Fettsäuremethylester; GC-MS, Gas-Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie; TAG, Triacylglycerin; TLC, Dünnschichtchromatographie).

5

Der unzweideutige Nachweis für das Vorliegen von Fettsäureprodukten kann mittels Analyse rekombinanter Organismen nach Standard-Analyseverfahren erhalten werden: GC, GC-MS oder TLC, wie verschiedentlich beschrieben von Christie und den Literaturstellen darin (1997, in: Advances on Lipid
10 Methodology, Vierte Aufl.: Christie, Oily Press, Dundee, 119-169; 1998, Gaschromatographie-Massenspektrometrie-Verfahren, Lipide 33:343-353).

Das zu analysierende Material kann durch Ultraschallbehandlung, Mahlen in der Glasmühle, flüssigen Stickstoff und Mahlen oder über andere
15 anwendbare Verfahren aufgebrochen werden. Das Material muss nach dem Aufbrechen zentrifugiert werden. Das Sediment wird in Aqua dest. resuspendiert, 10 min bei 100 °C erhitzt, auf Eis abgekühlt und erneut zentrifugiert, gefolgt von Extraktion in 0,5 M Schwefelsäure in Methanol mit 2
20 % Dimethoxypropan für 1 Std. bei 90 °C, was zu hydrolysierten Öl- und Lipidverbindungen führt, die transmethylierte Lipide ergeben. Diese Fettsäuremethylester werden in Petrolether extrahiert und schließlich einer GC-Analyse unter Verwendung einer Kapillarsäule (Chrompack, WCOT Fused Silica, CP-Wax-52 CB, 25 Mikrom, 0,32 mm) bei einem Temperaturgradienten zwischen 170 °C und 240 °C für 20 min und 5 min bei
25 240 °C unterworfen. Die Identität der erhaltenen Fettsäuremethylester muss unter Verwendung von Standards, die aus kommerziellen Quellen erhältlich sind (d.h. Sigma), definiert werden.

10. Analyse der Expression von Lotus-Leghemoglobin, Arabidopsis-Hemoglobin1, Arabidopsis-Hemoglobin2 in reifenden Samen von Arabidopsis.

5 Zur Überprüfung der Expression der Transgene Hemoglobin1 bzw. Hemoglobin 2 aus Arabidopsis thaliana (AtHb1 bzw. AtHb2) sowie Leghemoglobin aus Lotus japonicus (LjLegHb) wurden Northern Blot-Analysen durchgeführt. Hierzu wurde gesamt RNA aus reifenden Samen transgener und Wildtyp-Pflanzen isoliert, elektrophoretisch aufgetrennt und
10 die Transkripte mit den entsprechenden Digoxigenin-markierten Sonden detektiert. Für jede Linie wurden 2-4 unabhängige Analysen durchgeführt. Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Ergebnisse der Expressionsanalysen mit reifenden T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die entweder Lotus-Hemoglobin (LjLegHb), Arabidopsis-Hemoglobin1 (AtHb1) oder Arabidopsis-Hemoglobin2 (AtHb2) exprimieren. In fast allen analysierten Linien wird das transformierte Gen transkribiert, da die entsprechende mRNA nachgewiesen
15 werden kann. In den Kontrollen kann hingegen kein Transkript nachgewiesen werden.

20 11. Analyse des Ölgehalts von transformierten Lotus-Leghemoglobin und Arabidopsis-Hemoglobine exprimierenden Arabidopsis-Pflanzen

Die Bestimmung der Ölgehalte in den Samen transgener Arabidopsis-Pflanzen, die Lotus-Leghemoglobin, Arabidopsis-Hemoglobin1 oder
25 Arabidopsis Hemoglobin2 exprimieren, erfolgt indirekt über die Quantifizierung der Gesamtfettsäuren. Hierzu wurde folgendes Protokoll angewendet:

Die Extraktion der Lipide aus den Samen erfolgt nach der Methode von Blight & Dyer, 1959 Can. J. Biochem. Physiol. 37:911. Für jede Messung werden

hierzu 5-10 Samen in 1,2 ml Qiagen-Microtubes (Qiagen, Hilden) überführt, in einer Retsch Schwingmühle (MM300, Firma Retsch (Haan) pulverisiert und die Gesamtlipide durch Zugabe von 500 µl Chloroform/Methanol (2:1, enthält Pentadecansäure (C15) als internen Standard) extrahiert. Nach Zugabe von
5 500 µl 50 mM Kaliumphosphatpuffer pH 7,5 erfolgt die Phasentrennung. Die organische Phase wird in ein Pyrex-Röhrchen überführt und bis zur Trockene eingengt. Anschließend erfolgt die Derivatisierung der Gesamtfettsäuren zu Fettsäuremethylestern nach der Methode von Benning & Sommerville, 1992 J. Bacteriol. 174: 6479-6487 durch Zugabe von 1N
10 H₂SO₄ in Methanol und 2 % (v/v) Dimethoxypropane für 1 h bei 80 °C. Diese Fettsäuremethylester werden in Petrolether extrahiert und schließlich gaschromatographisch unter Verwendung einer Kapillarsäule (Chrompack, WCOT Fused Silica, CP-Wax-52, 25 mikom, 0,32 mm) analysiert. Die Quantifizierung der Gesamtfettsäuren erfolgt durch Vergleich der
15 Signalflächen der Fettsäuremethylester mit der Signalfläche des internen Standards bekannter Konzentration. Ein weiterer Indikator für den Ölgehalt in *Arabidopsis thaliana* ist die Menge der Fettsäure Eicosensäure (20:1^{Δ11}), welche fast ausschließlich in den Speicherlipiden vorkommt.

Nach der Transformation von *Arabidopsis thaliana* werden transgene Linien
20 über Antibiotikaresistenz selektioniert. Hierzu wurden T1 Samen transformierter *Arabidopsis*-Pflanzen aus Hygromycin-haltigen Selektionsplatten ausgekeimt. Für die quantitative Bestimmung der Ölgehalte wurden T2 Samen von jeweils 4 unabhängigen transgenen Linien analysiert. Für die einzelnen Linien wurden hierbei 5-9 unabhängige Einzelmessungen
25 durchgeführt und die entsprechenden Mittelwerte gebildet.

Die Ergebnisse der Bestimmung der Ölgehalte in reifen T2 Samen transgener Pflanzen, die Lotus-Leghemoglobin exprimieren, sind beispielhaft in der Tabelle 3 und in der Abbildung 2 gezeigt. Gemäß der Erfindung führt die

Expression des Lotus-Leghemoglobins in den Linien 4 und 5 zu einer signifikanten Erhöhung des Ölgehaltes um 17,14 % bzw. 17,54 %.

Die Ergebnisse der Bestimmung der Ölgehalte in reifen T2 Samen transgener Pflanzen, die Arabidopsis-Hemoglobin1 exprimieren, sind beispielhaft in der
5 Tabelle 4 und in der Abbildung 3 gezeigt. Gemäß der Erfindung führt die Expression des Arabidopsis-Hemoglobins1 in den Linien 35, 13 und 39 zu einer signifikanten Erhöhung des Ölgehaltes um 9,78 %, 12,22 % bzw. 51,16 %.

Die Ergebnisse der Bestimmung der Ölgehalte in reifen T2 Samen transgener
10 Pflanzen, die Arabidopsis-Hemoglobin2 exprimieren, sind beispielhaft in der Tabelle 5 und in der Abbildung 4 gezeigt. Gemäß der Erfindung führt die Expression des Arabidopsis-Hemoglobins 2 in den Linien 2, 10 und 11 zu einer signifikanten Erhöhung des Ölgehaltes um 16,25 %, 21,86 % bzw. 23,80 %.

15

12. Bestimmung des Stärkegehalts in transformierten Lotus-Leghemoglobin exprimierenden Kartoffelpflanzen

Zur Bestimmung des Stärkegehaltes von Knollen der Kartoffelpflanzen wird
20 die Dichtemessung nach Schéele C. von, Svensson, G. and Rasmusson J., Die Bestimmung des Stärkegehalts und der Trockensubstanz der Kartoffel mit Hilfe des spezifischen Gewichts. Landw. Vers Sta. 127: 67-96, 1937 eingesetzt. Anhand der Dichtemessung kann dann durch Umrechnung auf den Stärkegehalt geschlossen werden. Zur Umrechnung wurde folgende
25 Formel angewendet:

Die spezifische Dichte wurde durch Wiegen der Knollen sowohl in der Luft als auch in Wasser bestimmt, wobei x die Masse in Luft und y die Masse in Wasser ist. Die spezifische Dichte ergibt sich dann aus $x/(x-y)$. Desweiteren

wurden folgende Beziehungen aus 560 gemessenen Proben gemittelt (Burton W.G. (1989) The Potato. Longman, New York):

$$\% \text{ Trockenmasse} = 24.182 + [211.04 * (\text{sp. Dichte} - 1.0988)]$$

5

$$\% \text{ Stärke} = 17.546 + [199.07 * (\text{sp. Dichte} - 1.0988)]$$

Für die Messungen der Leghemoglobin exprimierenden Pflanzen und der Kontrollpflanzen zu Vergleichszwecken wurden unterschiedlich große
10 Kartoffelknollen verschiedener transgenen Linien sowie der Kontrollpflanzen eingesetzt. Die unterschiedlichen Größen dienen dazu, den beobachteten Effekt in allen Knollengrößen zu reproduzieren.

Die Aufarbeitung bzw. Gewinnung von Stärke aus den Leghemoglobin-
15 exprimierenden Kartoffeln kann nach dem Fachmann bekannten üblichen verfahren z. B. gemäss den Angaben der US Patentanmeldung 2001/0041199 A1, Seite 4, Beispiel 1, erfolgen.

Für die Messung des Stärkegehaltes in den Knollen der Leghemoglobin
20 exprimierenden Pflanzen sowie der Kontrollpflanzen zu Vergleichszwecken wurden die Pflanzen sowohl im Gewächshaus als auch im Foliengewächshaus angezogen. Die verschiedenen Kultivierungen dienen dazu, den beobachteten Effekt unter verschiedenen Klimabedingungen zu reproduzieren. Für die Messungen wurden unterschiedlich große
25 Kartoffelknollen eingesetzt, um den beobachteten Effekt in allen Knollengrößen zu reproduzieren.

In Tabelle 6 sind beispielhaft die Werte einer transgenen Linie im Vergleich zu Kontrollpflanzen gezeigt, die beide im Gewächshaus kultiviert wurden.

Aufgeführt sind jeweils 6 Messungen verschiedener Knollen einer Linie und die resultierenden Mittelwerte und Standardabweichungen. Dabei kann gemäß der Erfindung eine signifikante Erhöhung des Stärkegehalts in der transgenen Linie um 40,77 % nachgewiesen werden. Für weitere Linien werden ähnliche Werte erreicht.

In Abbildung 5 sind die durchschnittlichen Stärkegehalte von vier unabhängigen transgenen Linien im Vergleich zu Kontrollpflanzen gezeigt, die alle im Zeitraum vom Mai 2003 bis September 2003 im Foliengewächshaus in Golm kultiviert wurden. Die durchschnittlichen Messwerte basieren hierbei auf 334 Knollen (Linie 13), 358 Knollen (Linie 57), 380 Knollen (Linie 45), 384 Knollen (Linie 54) und 151 Knollen (Wildtyp). Gemäß der Erfindung konnte auch unter den im Foliengewächshaus vorherrschenden Klimabedingungen eine signifikante Erhöhung des Stärkegehaltes in den Knollen der Leghemoglobin-exprimierenden transformierten Pflanzen beobachtet werden, so dass die Ergebnisse aus dem Gewächshaus bestätigt werden konnten. Die im Foliengewächshaus während der Anzucht vorherrschenden Temperaturbedingungen sind der Abbildung 6 zu entnehmen.

Tabelle 3. Ölgehalte in T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die LjLegHb exprimieren, im Vergleich zur Kontrolle. Die Einzelmessungen wurden mit jeweils 5-10 Samen durchgeführt und die entsprechenden Ölgehalte sind als μg Fettsäuren pro Samen angegeben.

10

Linie	WT	Linie 1.1.9	Linie 3	Linie 5	Linie 4
	6,39	9,86	6,46	8,43	8,64
	9,38	9,79	6,87	9,04	8,99
	9,38	8,98	7,89	8,91	9,18
	7,48	9,72	9,45	8,77	8,43
	9,38	7,78	8,16		6,57
	6,87	7,54	8,30		10,74
	8,44	7,59	6,97		
	6,03	4,31			
	3,93				
Mittelwert	7,48	8,20	7,73	8,79	8,76
Standardabweichung	1,77	1,74	0,96	0,23	1,23
relative Ölzunahme		9,61	3,34	17,54	17,14

Tabelle 4. Ölgehalte in T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die AtHb1 exprimieren, im Vergleich zur Kontrolle. Die Einzelmessungen wurden mit jeweils 5-10 Samen durchgeführt und die entsprechenden Ölgehalte sind als μg Fettsäuren pro Samen

Linie	WT	Linie 39	Linie 35	Linie 17	Linie 13
	6,39	12,17	8,13	7,96	8,02
	9,38	11,02	7,48	6,73	9,04
	9,38	10,54	7,82	7,45	8,16
	7,48	10,13	7,89	6,05	8,09
	9,38	9,93	9,72		8,64
	6,87	13,40			
	8,44	11,36			
	6,03	11,22			
	3,93	11,97			
Mittelwert	7,48	11,30	8,21	7,05	8,39
Standardabweichung	1,77	1,03	0,79	0,72	0,39
relative Olzunahme		51,16	9,78	-5,77	12,22

Tabelle 5. Ölgehalte in T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die AtHb2 exprimieren, im Vergleich zur Kontrolle. Die Einzelmessungen wurden mit jeweils 5-10 Samen durchgeführt und die entsprechenden Ölgehalte sind als µg Fettsäuren pro Samen angegeben.

10

Linie	WT	Linie 10	Linie 9	Linie 11	Linie 2
	6,39	8,36	9,79	8,26	8,73
	9,38	8,53	8,50	9,66	8,36
	9,38	9,83	9,79	8,23	9,11
	7,48	9,72	9,93	8,98	8,57
	9,38		6,69	11,16	
	6,87		3,06		
	8,44		7,54		
	6,03				
	3,93				
Mittelwert	7,48	9,11	7,90	9,26	8,69
Standardabweichung	1,77	0,67	2,29	1,09	0,27
relative Ölzunahme		21,86	5,64	23,80	16,25

Tabelle 6: Bestimmung der spezifischen Dichte einer transgenen Linie im Vergleich zu einer Kontrollpflanze.

	Wildtyp				LegHb			
	Luft	Wasser	Wasser/Luft	Dichte	Luft	Wasser	Wasser/Luft	Dichte
Knolle1	5,4500	0,2700	0,0500	1,0521	13,990	1,0000	0,0710	1,0770
Knolle2	8,9900	0,3300	0,0370	1,0381	15,530	1,1000	0,0710	1,0762
Knolle3	25,7900	1,4700	0,0570	1,0604	30,280	2,2000	0,0730	1,0783
Knolle4	30,7000	1,9300	0,0630	1,0671	50,740	3,2300	0,0640	1,0680
Knolle5	37,4500	1,9900	0,0530	1,0561	59,430	4,0600	0,0680	1,0733
Knolle6	80,9300	4,5000	0,0560	1,0589	67,120	4,3600	0,0650	1,0695
Mittelwert				1,0555				1,0737
STD				0,0090				0,0039
% Stärke	8,9181				12,554			
Erhöhung in %					40,77			




Abbildung 1. Northern Blot-Analysen mit reifenden Samen transgener Arabidopsis-Pflanzen die mit Lotus-Leghemoglobin (LjLegHb), Arabidopsis-Hemoglobin1 (AtHb1) oder Arabidopsis-Hemoglobin2 (AtHb2) transformiert worden waren. Die Menge der eingesetzten Gesamt-RNA erfolgt durch Vergleich der Menge an ribosomaler RNA (rRNA).




Abbildung 2. Graphische Darstellung der Ölgehalte in T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die LjLegHb exprimieren, im Vergleich zur Kontrolle. Aufgeführt sind einerseits die Werte aus 4-9 Einzelmessungen mit jeweils 5-10 Samen (●) und andererseits die resultierenden Mittelwerte mit den dazugehörigen Standardabweichungen (◐).




Abbildung 3. Graphische Darstellung der Ölgehalte in T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die AtHb1 exprimieren, im Vergleich zur Kontrolle. Aufgeführt sind einerseits die Werte aus 4-9 Einzelmessungen mit jeweils 5-10 Samen (●) und andererseits die resultierenden Mittelwerte mit den dazugehörigen Standardabweichungen (○).




Abbildung 4. Graphische Darstellung der Ölgehalte in T2 Samen transgener Arabidopsis-Linien, die AtHb2 exprimieren, im Vergleich zur Kontrolle. Aufgeführt sind einerseits die Werte aus 4-9 Einzelmessungen mit jeweils 5-10 Samen (●) und andererseits die resultierenden Mittelwerte mit den dazugehörigen Standardabweichungen (⊗).




Abbildung 5. Stärkegehalt von Leghemoglobin exprimierenden Kartoffel-Knollen im Vergleich zum Wildtyp. Pflanzen wurden im Foliengewächshaus in Golm im Sommer 2003 gezogen, und abgereifte Knollen geerntet. Der Stärkegehalt wurde durch Bestimmung der Dichte (specific gravity) der Knollen gemessen. Die Daten basieren jeweils auf 334 Knollen (Linie 13), 358 Knollen (Linie 57), 380 Knollen (Linie 45), 384 Knollen (Linie 54) und 151 Knollen (Wildtyp).




Abbildung 6. Temperaturmessungen im Foliengewächshaus, in dem die transgenen Kartoffelpflanzen, die das Leghämoglobin aus *Lotus japonicus* überexprimierten, angezogen wurden. Angegeben sind jeweils die Temperaturmaxima und –minima.

Patentansprüche

1. Transformierte Pflanze, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mindestens ein Leghemoglobin exprimiert.
- 5 2. Transformierte Pflanze nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mindestens eine Sequenz Nr. 1 codierend für ein Leghemoglobin umfasst.
3. Transformierte Pflanze nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie eine Sequenz umfasst, die mit der Sequenz Nr. 1 zu ca. 70 %
10 identisch ist.
4. Transformierte Pflanze, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mindestens ein Hemoglobin oder mindestens ein Leghemoglobin und mindestens ein Hemoglobin exprimiert.
5. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch**
15 **gekennzeichnet, dass** das Leghemoglobin und/oder Hemoglobin aus Pflanzen aus der Gruppe bestehend aus *Lupinus luteus*, *Glycine max*, *Medicago sativa*, *Medicago trunculata*, *Phaseolus vulgaris*, *Vicia faba*, *Pisum sativum*, *Vigna unguiculata*, *Lotus japonicus*, *Psophocarpus tetragonolobus*, *Sesbania rostrata*, *Casuarina glauca* und *Canvalaria lineata* ausgewählt wird.
20
6. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Leghemoglobin und/oder Hemoglobin aus *Lotus japonicus* und *Arabidopsis thaliana* stammt.
7. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch**
25 **gekennzeichnet, dass** sie das Leghemoglobin und/oder Hemoglobin speicherorganspezifisch exprimiert.
8. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie das mindestens eine Leghemoglobin

und/oder Hemoglobin knollenspezifisch und/oder samenspezifisch exprimiert.

- 5 9. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 4 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mindestens eine der Sequenzen Nr. 3 und 5 codierend für Hemoglobin oder mindestens eine Sequenz Nr. 1 codierend für ein Leghemoglobin und mindestens eine der Sequenzen Nr. 3 und 5 codierend für Hemoglobin umfasst.
- 10 10. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 4 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie Sequenzen umfasst, die mit den Sequenzen Nr. 1, 3 und/oder 5 zu ca. 70 % identisch sind.
11. Transformierte Pflanze nach einem der vorhergehenden Ansprüche **dadurch gekennzeichnet, dass** sie Stärke und/oder Öl produziert.
12. Transformierte Pflanze nach einem der vorhergehenden Ansprüche **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich um monokotyle Kulturpflanzen, insbesondere der Art Gramineae handelt.
- 15 13. Transformierte Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich um dikotyledone Kulturpflanzen, insbesondere der Familie Asteraceae, Brassicaceae, Compositae, Cruciferae, Cucurbitaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Solanaceae, Sterculiaceae, Theaceae oder Umbelliferae handelt.
- 20 14. Transformierte Pflanze nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** es sich um Kartoffeln, Arabidopsis thaliana, Soja oder Raps handelt.
15. Nukleotidsequenz gemäß Sequenz Nr. 1 codierend für Leghemoglobin zur Verwendung in einer Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 14.
- 25 16. Genstruktur enthaltend mindestens eine Nukleotidsequenz gemäß Anspruch 15.

17. Vektor enthaltend mindestens eine oder mehrere Nukleotidsequenzen gemäß Anspruch 15 oder eine oder mehrere Genstrukturen gemäß Anspruch 16.
18. Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 14 enthaltend mindestens
5 eine Genstruktur gemäß Anspruch 16.
19. Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 14 enthaltend mindestens einen Vektor gemäß Anspruch 17.
20. Nukleotidsequenz gemäß Sequenzen gem. Nr. 3 und 5 codierend für Hemoglobin zur Verwendung in einer Pflanze nach einem der
10 Ansprüche 4 bis 14.
21. Genstruktur enthaltend mindestens eine Nukleotidsequenz gem. Anspruch 20.
22. Vektor enthaltend mindestens eine oder mehrere Nukleotidsequenzen gemäß Anspruch 20 oder eine oder mehrere Genstrukturen gemäß
15 Anspruch 21.
23. Pflanze nach einem der Ansprüche 4 bis 14 enthaltend mindestens eine Genstruktur gemäß Anspruch 21.
24. Pflanze nach einem der Ansprüche 4 bis 14 enthaltend mindestens einen Vektor gemäß Anspruch 24.
- 20 25. Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, dass Pflanzen derart transformiert werden, dass sie mindestens ein Leghemoglobin exprimieren.
26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die
25 Pflanzen derart transformiert werden, dass sie mindestens eine Sequenz Nr. 1 codierend für ein Leghemoglobin umfasst.
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Pflanzen derart transformiert werden, dass

sie eine Sequenz umfassen, die mit der Sequenz Nr. 1 zu ca. 70 % identisch ist.

28. Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen, **dadurch gekennzeichnet, dass** Pflanzen derart transformiert werden, dass sie mindestens Hemoglobin oder ein Leghemoglobin und mindestens ein Hemoglobin exprimieren.
29. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 28, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Leghemoglobin und Hemoglobin aus Pflanzen aus der Gruppe bestehend aus *Arabidopsis thaliana*, *Lupinus luteus*, *Glycine max*, *Medicago sativa*, *Medicago trunculata*, *Phaseolus vulgaris*, *Vicia faba*, *Pisum sativum*, *Vigna unguiculata*, *Lotus japonicus*, *Psophocarpus tetragonolobus*, *Sesbania rostrata*, *Casuarina glauca* und *Canvalaria lineata* ausgewählt wird.
30. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 29, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Leghemoglobin und/oder Hemoglobin aus *Lotus japonicus* *Arabidopsis thaliana* stammt.
31. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 30, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pflanzen derart transformiert werden, dass sie das Leghemoglobin und Hemoglobin speicherorganspezifisch exprimiert.
32. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 31, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pflanzen derart transformiert werden, dass sie das Leghemoglobin und Hemoglobin knollenspezifisch und/oder samenspezifisch exprimiert.
33. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 32, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pflanzen derart transformiert werden, dass sie mindestens eine Sequenz Nr. 3 und/oder Nr. 5 codierend für Hemoglobin oder mindestens eine Sequenz Nr. 1 codierend für ein

Leghemoglobin und mindestens eine Sequenz Nr. 3 und/oder 5 codierend für Hemoglobin umfasst.

- 5 34. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 26 bis 33, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pflanzen derart transformiert werden, dass sie Sequenzen umfassen, die mit einer der Sequenzen Nr. 1, 3 und/oder 5 zu ca. 70 % identisch sind.
35. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 34, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pflanzen derart transformiert werden, dass sie Stärke und/oder Öl produziert.
- 10 36. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 35, **dadurch gekennzeichnet, dass** monokotyle Kulturpflanzen, insbesondere der Art Gramineae transformiert werden.
37. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 26 bis 36, **dadurch gekennzeichnet, dass** dikotyledone Kulturpflanzen, insbesondere der Familie Asteraceae, Brassicaceae, Compositae, 15 Cruciferae, Cucurbitaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Solanaceae, Sterculiaceae, Theaceae oder Umbelliferae transformiert werden.
38. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 26 bis 37, **dadurch gekennzeichnet, dass** Kartoffeln, Arabidopsis thaliana, Soja oder Raps transformiert werden. 20
39. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 26 bis 38, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens eine Nukleotidsequenz gemäß Anspruch 15 für die Transformation verwendet wird.
40. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 39, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens eine Genstruktur gemäß Anspruch 25 16 für die Transformation verwendet wird.
41. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 40, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens ein Vektor gemäß Anspruch 17 für die Transformation verwendet wird.

42. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 41, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens eine Nukleotidsequenz gemäß Anspruch 20 für die Transformation verwendet wird.
- 5 43. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 42, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens eine Genstruktur gemäß Anspruch 21 für die Transformation verwendet wird.
44. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 43, **dadurch gekennzeichnet, dass** mindestens ein Vektor gemäß Anspruch 22 für die Transformation verwendet wird.
- 10 45. Verwendung einer Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 14, 18 oder 19 zur Produktion von Stärke und/oder Öl.
46. Verwendung einer Pflanze nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 11 bis 24 zur Herstellung von Stärke und/oder Öl.

SEQUENCE LISTING

<110> Max-Planck-Gesellschaft

<120> Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in
Pflanzen

<130> NAE 737/02 PCT

<150> DE 10260707.9

<151> 2002-12-23

<160> 6

<170> PatentIn version 3.2

<210> 1

<211> 444

<212> DNA

<213> Lotus japonicus

<220>

<221> CDS

<222> (1)..(444)

<400> 1

atg ggt ttc act gcg cag caa gag gct cta gtg ggt agc tca tac gaa
48

Met Gly Phe Thr Ala Gln Gln Glu Ala Leu Val Gly Ser Ser Tyr Glu
1 5 10 15

aca .ttc aag aaa aac ctt cct acc aac agt gtt ttg ttc tac acc gtt
96

Thr Phe Lys Lys Asn Leu Pro Thr Asn Ser Val Leu Phe Tyr Thr Val

20 25 30

ata ttg gag ata gca cca act gca aaa gac atg ttc tcc ttt cta aag
144
Ile Leu Glu Ile Ala Pro Thr Ala Lys Asp Met Phe Ser Phe Leu Lys
35 40 45

gag tct ggg cct aag cat agt cct cag ctc cag gcc cat gct gaa aag
192
Glu Ser Gly Pro Lys His Ser Pro Gln Leu Gln Ala His Ala Glu Lys
50 55 60

gtt ttt gca ctg act cgt gat gct gcc act caa ctc gta gca aaa gga
240
Val Phe Ala Leu Thr Arg Asp Ala Ala Thr Gln Leu Val Ala Lys Gly
65 70 75 80

gaa gtg aca ctt gca gat gcc agc tta ggt gct gtc cac gtt cag aaa
288
Glu Val Thr Leu Ala Asp Ala Ser Leu Gly Ala Val His Val Gln Lys
85 90 95

gcc gtt act gat cct cat ttc gtg gtg gtt aaa gaa gcc ctg ctt caa
336
Ala Val Thr Asp Pro His Phe Val Val Val Lys Glu Ala Leu Leu Gln
100 105 110

aca gta aag gaa gca gtt ggg gcg gac gaa tgg agt gat gac ttg agc
384
Thr Val Lys Glu Ala Val Gly Ala Asp Glu Trp Ser Asp Asp Leu Ser
115 120 125

acc gct tgg gaa gga gca tat gat gga cta gca act gca att aag aag
432
Thr Ala Trp Glu Gly Ala Tyr Asp Gly Leu Ala Thr Ala Ile Lys Lys

130

135

140

gca atg ggt taa

444

Ala Met Gly

145

<210> 2

<211> 147

<212> PRT

<213> Lotus japonicus

<400> 2

Met Gly Phe Thr Ala Gln Gln Glu Ala Leu Val Gly Ser Ser Tyr Glu

1

5

10

15

Thr Phe Lys Lys Asn Leu Pro Thr Asn Ser Val Leu Phe Tyr Thr Val

20

25

30

Ile Leu Glu Ile Ala Pro Thr Ala Lys Asp Met Phe Ser Phe Leu Lys

35

40

45

Glu Ser Gly Pro Lys His Ser Pro Gln Leu Gln Ala His Ala Glu Lys

50

55

60

Val Phe Ala Leu Thr Arg Asp Ala Ala Thr Gln Leu Val Ala Lys Gly

65

70

75

80

Glu Val Thr Leu Ala Asp Ala Ser Leu Gly Ala Val His Val Gln Lys
85 90 95

Ala Val Thr Asp Pro His Phe Val Val Val Lys Glu Ala Leu Leu Gln
100 105 110

Thr Val Lys Glu Ala Val Gly Ala Asp Glu Trp Ser Asp Asp Leu Ser
115 120 125

Thr Ala Trp Glu Gly Ala Tyr Asp Gly Leu Ala Thr Ala Ile Lys Lys
130 135 140

Ala Met Gly
145

<210> 3
<211> 483
<212> DNA
<213> Arabidopsis thaliana

<220>
<221> CDS
<222> (1)..(483)

<400> 3
atg gag agt gaa gga aag att gtg ttc aca gaa gag caa gag gct ctt
48
Met Glu Ser Glu Gly Lys Ile Val Phe Thr Glu Glu Gln Glu Ala Leu
1 5 10 15

gta gtg aag tct tgg agt gtc atg aag aaa aac tca gct gaa tta ggt
96

Val Val Lys Ser Trp Ser Val Met Lys Lys Asn Ser Ala Glu Leu Gly
20 25 30

ctc aaa ctc ttc atc aag atc ttt gag att gca cca aca acg aag aag
144

Leu Lys Leu Phe Ile Lys Ile Phe Glu Ile Ala Pro Thr Thr Lys Lys
35 40 45

atg ttc tct ttc ttg aga gac tca cca att cct gct gag caa aat cca
192

Met Phe Ser Phe Leu Arg Asp Ser Pro Ile Pro Ala Glu Gln Asn Pro
50 55 60

aag ctc aag cct cac gca atg tct gtt ttt gtc atg tgt tgt gaa tca
240

Lys Leu Lys Pro His Ala Met Ser Val Phe Val Met Cys Cys Glu Ser
65 70 75 80

gca gta caa ctg agg aaa aca ggg aaa gtt acg gtg agg gag act act
288

Ala Val Gln Leu Arg Lys Thr Gly Lys Val Thr Val Arg Glu Thr Thr
85 90 95

ttg aag aga ctt gga gcc agc cat tct aaa tac ggt gtc gtt gac gaa
336

Leu Lys Arg Leu Gly Ala Ser His Ser Lys Tyr Gly Val Val Asp Glu
100 105 110

cac ttt gag gtg gcc aag tat gca ttg ttg gag acg ata aag gag gca
384

His Phe Glu Val Ala Lys Tyr Ala Leu Leu Glu Thr Ile Lys Glu Ala
115 120 125

gtg ccg gag atg tgg tca ccg gag atg aag gtg gct tgg ggt cag gct
432

Val Pro Glu Met Trp Ser Pro Glu Met Lys Val Ala Trp Gly Gln Ala
130 135 140

tat gat cac ctt gtt gct gcc att aaa gct gaa atg aat ctt tcc aac
480

Tyr Asp His Leu Val Ala Ala Ile Lys Ala Glu Met Asn Leu Ser Asn
145 150 155 160

taa

483

<210> 4

<211> 160

<212> PRT

<213> Arabidopsis thaliana

<400> 4

Met Glu Ser Glu Gly Lys Ile Val Phe Thr Glu Glu Gln Glu Ala Leu
1 5 10 15

Val Val Lys Ser Trp Ser Val Met Lys Lys Asn Ser Ala Glu Leu Gly
20 25 30

Leu Lys Leu Phe Ile Lys Ile Phe Glu Ile Ala Pro Thr Thr Lys Lys
35 40 45

Met Phe Ser Phe Leu Arg Asp Ser Pro Ile Pro Ala Glu Gln Asn Pro

50

55

60

Lys Leu Lys Pro His Ala Met Ser Val Phe Val Met Cys Cys Glu Ser
65 70 75 80

Ala Val Gln Leu Arg Lys Thr Gly Lys Val Thr Val Arg Glu Thr Thr
85 90 95

Leu Lys Arg Leu Gly Ala Ser His Ser Lys Tyr Gly Val Val Asp Glu
100 105 110

His Phe Glu Val Ala Lys Tyr Ala Leu Leu Glu Thr Ile Lys Glu Ala
115 120 125

Val Pro Glu Met Trp Ser Pro Glu Met Lys Val Ala Trp Gly Gln Ala
130 135 140

Tyr Asp His Leu Val Ala Ala Ile Lys Ala Glu Met Asn Leu Ser Asn
145 150 155 160

<210> 5

<211> 477

<212> DNA

<213> Arabidopsis thaliana

<220>

<221> CDS

<222> (1)..(477)

<400> 5

atg gga gag att ggg ttt aca gag aag caa gaa gct ttg gtg aag gaa.

48

Met Gly Glu Ile Gly Phe Thr Glu Lys Gln Glu Ala Leu Val Lys Glu

1

5

10

15

tcg tgg gag ata ctg aaa caa gac atc ccc aaa tac agc ctt cac ttc

96

Ser Trp Glu Ile Leu Lys Gln Asp Ile Pro Lys Tyr Ser Leu His Phe

20

25

30

ttc tca cag ata ctg gag ata gca cca gca gca aaa ggc ttg ttc tct

144

Phe Ser Gln Ile Leu Glu Ile Ala Pro Ala Ala Lys Gly Leu Phe Ser

35

40

45

ttc cta aga gac tca gat gaa gtc cct cac aac aat cct aaa ctc aaa

192

Phe Leu Arg Asp Ser Asp Glu Val Pro His Asn Asn Pro Lys Leu Lys

50

55

60

gct cat gct gtt aaa gtc ttc aag atg aca tgt gaa aca gct ata cag

240

Ala His Ala Val Lys Val Phe Lys Met Thr Cys Glu Thr Ala Ile Gln

65

70

75

80

ctg agg gag gaa gga aag gtg gta gtg gct gac aca acc ctc caa tat

288

Leu Arg Glu Glu Gly Lys Val Val Val Ala Asp Thr Thr Leu Gln Tyr

85

90

95

tta ggc tca att cat ctc aaa agc ggc gtt att gac cct cac ttc gag

336

Leu Gly Ser Ile His Leu Lys Ser Gly Val Ile Asp Pro His Phe Glu
100 105 110

gtg gtg aaa gaa gct ttg cta agg aca ttg aaa gag ggg ttg ggg gag
384

Val Val Lys Glu Ala Leu Leu Arg Thr Leu Lys Glu Gly Leu Gly Glu
115 120 125

aaa tac aat gaa gaa gtg gaa ggt gct tgg tct caa gct tat gat cac
432

Lys Tyr Asn Glu Glu Val Glu Gly Ala Trp Ser Gln Ala Tyr Asp His
130 135 140

ttg gct tta gcc atc aag acc gag atg aaa caa gaa gag tca taa
477

Leu Ala Leu Ala Ile Lys Thr Glu Met Lys Gln Glu Glu Ser
145 150 155

<210> 6

<211> 158

<212> PRT

<213> Arabidopsis thaliana

<400> 6

Met Gly Glu Ile Gly Phe Thr Glu Lys Gln Glu Ala Leu Val Lys Glu
1 5 10 15

Ser Trp Glu Ile Leu Lys Gln Asp Ile Pro Lys Tyr Ser Leu His Phe
20 25 30

Phe Ser Gln Ile Leu Glu Ile Ala Pro Ala Ala Lys Gly Leu Phe Ser

35

40

45

Phe Leu Arg Asp Ser Asp Glu Val Pro His Asn Asn Pro Lys Leu Lys
50 55 60

Ala His Ala Val Lys Val Phe Lys Met Thr Cys Glu Thr Ala Ile Gln
65 70 75 80

Leu Arg Glu Glu Gly Lys Val Val Val Ala Asp Thr Thr Leu Gln Tyr
85 90 95

Leu Gly Ser Ile His Leu Lys Ser Gly Val Ile Asp Pro His Phe Glu
100 105 110

Val Val Lys Glu Ala Leu Leu Arg Thr Leu Lys Glu Gly Leu Gly Glu
115 120 125

Lys Tyr Asn Glu Glu Val Glu Gly Ala Trp Ser Gln Ala Tyr Asp His
130 135 140

Leu Ala Leu Ala Ile Lys Thr Glu Met Lys Gln Glu Glu Ser
145 150 155

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2004 (15.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/057946 A3(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C12N 15/82,
C07K 14/415, A01H 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/014774

(22) Internationales Anmeldedatum:
23. Dezember 2003 (23.12.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 60 707.9 23. Dezember 2002 (23.12.2002) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT [DE/DE];
Hofgartenstr. 8, 80539 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEIGENBERGER,
Peter [DE/DE]; Quantzstr. 12, 14129 Berlin (DE).
LANGER, Anke [DE/DE]; Sellostr. 27, 14471 Potsdam
(DE). VIGEOLAS, Helene [FR/DE]; Am alten Mörtel-
werk 14, 14469 Potsdam (DE). STITT NIGEL, Marc
[DE/DE]; Grosse Weinmeisterstr. 22a, 14469 Potsdam
(DE). THOMAS VAN DONGEN, Joost [NL/DE];
Leipziger Str. 52, 14473 Potsdam (DE). UDVARDI,
Michael [DE/DE]; Golmer Fichten 32, 14476 Golm (DE).(74) Anwalt: FITZNER, Uwe; Lintorfer Strasse 10, 40878
Ratingen (DE).(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL,
PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 2. September 2004Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR ALTERING THE CONTENT OF RESERVE SUBSTANCES IN PLANTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERÄNDERUNG DES GEHALTS VON SPEICHERSTOFFEN IN PFLANZEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for altering the content of reserve substances in plants during which leghemoglobin and/or hemoglobin expressing transformed plants are used. The invention also relates to corresponding plants and to the use thereof.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Veränderung des Gehalts von Speicherstoffen in Pflanzen, wo-
bei Leghemoglobin und/oder Hemoglobin exprimierende transformierte Pflanzen eingesetzt werden, entsprechende Pflanzen sowie
deren Verwendung.

WO 2004/057946 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern Application No

PCT/03/14774

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C12N15/82 C07K14/415 A01H5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C12N C07K A01H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CAB Data, Sequence Search

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 99/02687 A (JARDINAUD MARIE FRANCOISE ;PEACOCK WILLIAM JAMES (AU); COMMW SCIEN) 21 January 1999 (1999-01-21) see SEQ ID NO: 1 and 2 (pp. 50-54) page 33; claims 1-8,15,18-21,24-28,36; figures 3,5,8; example 1	1,3-14, 20-24, 28-38, 42-44
X	US 6 372 961 B1 (TARCZYNSKI MITCHELL C ET AL) 16 April 2002 (2002-04-16) column 1 - column 2; claims 1-4,8,9,11,13,14,17,18,22-31,33; examples 1,2 column 11 - column 12 ----- -/--	1,3-8, 10-14, 25, 27-29, 31,32, 34-38



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

7 June 2004

Date of mailing of the International search report

25/06/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Oderwald, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern: Application No
PCT/03/14774

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	BARATA R M ET AL: "Targeting of the soybean leghemoglobin to tobacco chloroplasts: Effects on aerobic metabolism in transgenic plants" PLANT SCIENCE (SHANNON), vol. 155, no. 2, 29 June 2000 (2000-06-29), pages 193-202, XP002283115 ISSN: 0168-9452 abstract page 194, paragraph 2 page 196, paragraph 4 page 197, paragraph 4 - page 198, paragraph 1	1,3-5, 13,25, 28,29,37
X	STOUGAARD, J. ET AL: "Expression of a complete soybean leghemoglobin gene in root nodules of transgenic Lotus corniculatus." PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, PUBLISHER: WASHINGTON, D.C.: THE ACADEMY. CODEN: PNASA6;ISSN: 0027-8424, vol. 84, no. 16, 1987, pages 5754-5757, XP002283117 abstract page 5754, paragraph 2	1,3-5,13
X	WO 98/12913 A (BAILEY JAMES E ;BULOW LEIF (SE)) 2 April 1998 (1998-04-02) cited in the application abstract; claims 1-3,6,9,14,32; figure 4; example 1 page 1 - page 4 page 6 - page 8 page 12 - page 15 page 23	1,3-5,7, 8,11-14, 25, 27-29, 31,32, 35-38
X	DATABASE EMBL 'Online! EBI, Hinxton; 18 November 2000 (2000-11-18), UCHIUMI T ET AL: "Genomic leghemoglobin genes from Lotus japonicus" XP002283119 Database accession no. AB042718 abstract	15-19

-/--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat'l Application No
PCT/ 03/14774

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DATABASE EMBL 'Online! EBI, Hinxton; 6 November 1997 (1997-11-06), TREVASKIS B ET AL: "Two hemoglobin genes in Arabidopsis thaliana: The evolutionary origins of leghemoglobins" XP002283120 Database accession no. U94999 abstract	20-22
X	-& TREVASKIS B ET AL: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA PUBLISHER: WASHINGTON, D.C.: NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, CODEN: PNASA6;ISSN: 0027-8424, vol. 94, October 1997 (1997-10), pages 12230-12234, XP002283114 abstract page 12233, last paragraph -----	23,24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

Intern: Application No

PCT 03/14774

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9902687	A	21-01-1999	AU 8199598 A WO 9902687 A1 CA 2295202 A1 EP 1007681 A1 JP 2001509385 T	08-02-1999 21-01-1999 21-01-1999 14-06-2000 24-07-2001
US 6372961	B1	16-04-2002	NONE	
WO 9812913	A	02-04-1998	US 5959187 A AU 730663 B2 AU 4502297 A BR 9711556 A CA 2266626 A1 EP 0955804 A1 HU 9904237 A2 JP 2001501098 T WO 9812913 A1	28-09-1999 08-03-2001 17-04-1998 18-01-2000 02-04-1998 17-11-1999 28-04-2000 30-01-2001 02-04-1998

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C12N15/82 C07K14/415 A01H5/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C12N C07K A01H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CAB Data, Sequence Search

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 99/02687 A (JARDINAUD MARIE FRANCOISE ;PEACOCK WILLIAM JAMES (AU); COMMW SCIEN) 21. Januar 1999 (1999-01-21) see SEQ ID NO: 1 and 2 (pp. 50-54) Seite 33; Ansprüche 1-8,15,18-21,24-28,36; Abbildungen 3,5,8; Beispiel 1	1,3-14, 20-24, 28-38, 42-44
X	US 6 372 961 B1 (TARCZYNSKI MITCHELL C ET AL) 16. April 2002 (2002-04-16) Spalte 1 - Spalte 2; Ansprüche 1-4,8,9,11,13,14,17,18,22-31,33; Beispiele 1,2 Spalte 11 - Spalte 12 ----- -/-	1,3-8, 10-14, 25, 27-29, 31,32, 34-38



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Juni 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

25/06/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Oderwald, H

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>BARATA R M ET AL: "Targeting of the soybean leghemoglobin to tobacco chloroplasts: Effects on aerobic metabolism in transgenic plants" PLANT SCIENCE (SHANNON), Bd. 155, Nr. 2, 29. Juni 2000 (2000-06-29), Seiten 193-202, XP002283115 ISSN: 0168-9452 Zusammenfassung Seite 194, Absatz 2 Seite 196, Absatz 4 Seite 197, Absatz 4 – Seite 198, Absatz 1</p>	1,3-5, 13,25, 28,29,37
X	<p>STOUGAARD, J. ET AL: "Expression of a complete soybean leghemoglobin gene in root nodules of transgenic Lotus corniculatus." PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, PUBLISHER: WASHINGTON, D.C.: THE ACADEMY. CODEN: PNASA6;ISSN: 0027-8424, Bd. 84, Nr. 16, 1987, Seiten 5754-5757, XP002283117 Zusammenfassung Seite 5754, Absatz 2</p>	1,3-5,13
X	<p>WO 98/12913 A (BAILEY JAMES E ;BULOW LEIF (SE)) 2. April 1998 (1998-04-02) in der Anmeldung erwähnt</p> <p>Zusammenfassung; Ansprüche 1-3,6,9,14,32; Abbildung 4; Beispiel 1 Seite 1 – Seite 4 Seite 6 – Seite 8 Seite 12 – Seite 15 Seite 23</p>	1,3-5,7, 8,11-14, 25, 27-29, 31,32, 35-38
X	<p>DATABASE EMBL 'Online! EBI, Hinxton; 18. November 2000 (2000-11-18), UCHIUMI T ET AL: "Genomic leghemoglobin genes from Lotus japonicus" XP002283119 Database accession no. AB042718 Zusammenfassung</p>	15-19
	----- -/--	

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>DATABASE EMBL 'Online! EBI, Hinxton; 6. November 1997 (1997-11-06), TREVASKIS B ET AL: "Two hemoglobin genes in Arabidopsis thaliana: The evolutionary origins of leghemoglobins" XP002283120 Database accession no. U94999</p>	20-22
X	<p>Zusammenfassung -& TREVASKIS B ET AL: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA PUBLISHER: WASHINGTON, D.C.: NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, CODEN: PNASA6;ISSN: 0027-8424, Bd. 94, Oktober 1997 (1997-10), Seiten 12230-12234, XP002283114 Zusammenfassung Seite 12233, letzter Absatz -----</p>	23,24

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung:

selben Patentfamilie gehören

Internat. Aktenzeichen

PCT/03/14774

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9902687 A	21-01-1999	AU 8199598 A WO 9902687 A1 CA 2295202 A1 EP 1007681 A1 JP 2001509385 T	08-02-1999 21-01-1999 21-01-1999 14-06-2000 24-07-2001
US 6372961 B1	16-04-2002	KEINE	
WO 9812913 A	02-04-1998	US 5959187 A AU 730663 B2 AU 4502297 A BR 9711556 A CA 2266626 A1 EP 0955804 A1 HU 9904237 A2 JP 2001501098 T WO 9812913 A1	28-09-1999 08-03-2001 17-04-1998 18-01-2000 02-04-1998 17-11-1999 28-04-2000 30-01-2001 02-04-1998

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER: _____**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.